

INFORME DE FARMACOLOGÍA

PRODUCTO: Ácido Ibandrónico 150mg tabletas recubiertas

INDICACIONES: Tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica, para reducir el riesgo de fracturas.

VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral

POSOLÓGIA: La dosis recomendada es de una tableta de 150 mg una vez al mes. La tableta debe tomarse preferiblemente el mismo día de cada mes.

Consúmalo en ayunas, con el estómago vacío, acompañado de bastante agua. Trague sin masticar el comprimido. No lo consuma con otro tipo de bebidas o cercano a alimentos, pues ellos pueden alterar su absorción y eficacia. Después de consumirlo no se acueste ni consuma alimentos, bebidas ni ningún otro tipo de medicamento por lo menos durante una hora. Nunca lo consuma en la noche ni para acostarse o antes de levantarse en la mañana.

En caso de olvido de una dosis, Si faltan más de 7 días para la toma de la siguiente dosis, consuma una dosis a la mañana siguiente de recordar su consumo. Vuelva a la fecha predeterminada para su consumo mensual. Si faltan menos de 7 días para la siguiente toma, espere hasta la próxima fecha predeterminada y tómela normalmente. Vuelva a consumirla de acuerdo a lo programado. Nunca consuma dos comprimidos en la misma semana.

CONTRAINDICACIONES, PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: Pacientes con antecedentes de alergia al ácido ibandrónico, a cualquiera de los excipientes o a otros bifosfonatos. Pacientes con hipocalcemia no corregida. Puede reducir transitoriamente los valores de calcio sérico. No debe administrarse en períodos de embarazo y lactancia.

REACCIONES ADVERSAS:

Trastornos del sistema inmunológico

- Poco frecuentes: Exacerbación de asma
- Raras: Reacciones de hipersensibilidad
- Muy raras: Reacción/ shock anafiláctico

Trastornos del sistema nervioso

- Frecuentes: Cefalea
- Poco frecuentes: Mareos

Trastornos oculares

- Raras: Inflamación ocular

Trastornos gastrointestinales

- Frecuentes: Esofagitis, gastritis, reflujo gastroesofágico, dispepsia, diarrea, dolor abdominal, náuseas.
- Poco frecuentes: Esofagitis, incluidas ulceraciones o estenosis esofágicas y disfagia, vómitos, flatulencia.
- Raras: Duodenitis

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo

- Frecuentes: Erupción cutánea
- Raras: Angioedema, edema facial, urticaria
- Muy raras: Síndrome de StevensJohnson, Eritema multiforme, Dermatitis bullosa.

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo

- Frecuentes: Artralgia, mialgia, dolor musculoesquelético, calambres musculares, rigidez musculoesquelética.
- Poco frecuentes: Dolor de espalda
- Raras: Fracturas atípicas subtrocantéricas y diafisarias del fémur
- Muy raras: Osteonecrosis mandibular, osteonecrosis del conducto auditivo externo (efecto de clase del grupo de los bisfosfonatos)

DIRECCIÓN GENERAL

PLANTA BOGOTÁ

PLANTA VILLA RICA