

INFORME DE FARMACOLOGÍA

PRODUCTO: Albendazol tabletas 200mg

INDICACIONES: Estrongiloidiasis, alternativa en infecciones mixtas por ascaris, oxiuros, tricocéfalos, anquilostoma y necator americano.

VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral

POSOLOGÍA:

Las dosis son dependientes de los parásitos implicados, del peso del paciente y de la gravedad de la infección.

Ascaris: 400mg via oral en una sola dosis con el estómago vacío.

Estrongiloidiasis: 400mg via oral con el estómago vacío por 3 días, realizar seguimiento a paciente por al menos dos semanas para confirmar cura.

CONTRAINDICACIONES, PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: El albendazol no deberá administrarse durante el embarazo ni a pacientes con posibilidad de embarazo. No administrar a niños menores de dos (2) años de edad. Contiene sacarina sódica

REACCIONES ADVERSAS:

Trastornos de la sangre y del sistema linfático

Poco frecuentes: leucopenia

Muy raras: pancitopenia, anemia aplásica, agranulocitosis

Se ha asociado leucopenia con el tratamiento con albendazol cuando se tratan pacientes con equinococosis. Los pacientes con enfermedad hepática, incluyendo equinococosis hepática, parecen ser más susceptibles a la supresión de la médula ósea.

Trastornos del sistema inmunológico

Poco frecuentes: reacciones de hipersensibilidad incluyendo rash, prurito y urticaria

Trastornos de sistema nervioso

Muy frecuentes: cefalea

Frecuentes: vértigo

Trastornos gastrointestinales

Frecuentes: alteraciones gastrointestinales (dolor abdominal, náuseas, vómitos)

Cuando se trata a pacientes con equinococosis se han asociado alteraciones gastrointestinales con albendazol.

Trastornos hepatobiliares

Muy frecuentes: aumento, de leve a moderado, de las enzimas hepáticas.

Poco frecuentes: hepatitis.

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo

Frecuentes: alopecia reversible (debilidad capilar, y moderada pérdida de pelo)

Muy raras: eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson

DIRECCIÓN GENERAL

PLANTA BOGOTA

PLANTA VILLA RICA