

INFORME DE FARMACOLOGÍA

PRODUCTO: Ampicilina tabletas 1g

INDICACIONES: Infecciones producidas por gérmenes sensibles a la ampicilina.

VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral

POSOLOGÍA: Las dosis se establecerá según la gravedad de la infección, el estado del paciente y la sensibilidad del germen. Como pauta usual puede seguirse la siguiente:
Adultos: 500 mg cada 6 horas.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS: Hipersensibilidad a las penicilinas y/o cefalosporinas. Adminístrese con precaución a pacientes con insuficiencia renal. No fraccionar las tabletas con fines de dosificación.

REACCIONES ADVERSAS:

Comunes

-Dermatológicas: rash, urticaria.

-Gastrointestinales: diarrea

Serías

-Dermatológicas: eritema multiforme, eritroderma, síndrome Stevens-Johnson, necrólisis tóxica epidermal.

-Gastrointestinales: enterocolitis pseudomembranosa

-Hematológicos: agranulocitosis, trombocitopenia.

-Inmunológicos: anafilaxia, reacción de hipersensibilidad

Genfar S.A.
Nit: 817.001.644 - 1

DIRECCIÓN GENERAL
Calle 20A No. 44-70 (Bogotá D.C. - Colombia)
PBX: (57) (1) 368 0077 - 368 0472 Fax: 368 3193
368 3850 - 368 4552

PLANTA BOGOTÁ
Calle 20B No. 44 - 61 (Bogotá D.C. - Colombia)
PBX: (57) (1) 368 0077 ext: 2136

PLANTA VILLA RICA
KM. 43 vía Panamericana Cali - Popayan
Parque Industrial Caucaudal s/n. Villa Rica
(Cauca Colombia) PBX: (57) (2) 390 5400 Fax 390 5455

Línea servicio al cliente: 01 8000 911333

www.genfar.com.co

E - mail: servicioclientegenfar@outsourcing.com.co