Ampicilina 500mg Cápsulas

INDICACIONES: Infecciones producidas por gérmenes sensibles a la ampicilina.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS: Hipersensibilidad a las penicilinas y/o a las cefalosporinas, adminístrese con precaución a pacientes con insuficiencia renal.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral, Adultos: 500 mg a 1.0 g cada 6 horas. Niños: 50 mg/Kg de peso por día en Via Oral. La dosis usual en Infecciones por gérmenes susceptibles es: dosis iguales cada 6 horas.

EMBARAZO Y LACTANCIA: La experiencia del uso de ampicilina en gestantes es limitada. La seguridad durante el embarazo no ha sido establecida. De manera general, las penicilinas atraviesan la barrera placentaria; por tanto debe evaluarse el riesgo-beneficio. Las penicilinas aparecen en la leche materna. El uso de penicilinas en madres lactantes puede dar lugar a sensibilización, diarrea, candidiasis y "rash" cutáneo en el lactante.

REACCIONES ADVERSAS: Pueden presentarse reacciones alérgicas, urticaria y erupciones eritematosas, cuya incidencia es mayor en pacientes afectados de mononucleosis infecciosa. Se han comunicado leucopenias, neutropenias y eosinofilias normalmente reversibles, así como elevación moderada de transaminasas séricas, especialmente en niños, que remiten al cesar el tratamiento. Pueden producirse alteraciones gastrointestinales, náuseas, vómitos y diarrea. En caso de aparecer sobreinfecciones producidas por gérmenes resistentes, debe suspenderse el tratamiento y aplicar la terapia adecuada.

Esporádicamente se ha descrito algún caso de hepatitis transitoria e ictericia colestática. Se ha comunicado elevación moderada y transitoria de las transaminasas en pacientes tratados con antibióticos aminopenicilínicos. Se han comunicado leucopenias, nefropenias, eosinofilia, trombocitopenia y anemia hemolítica.

REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2007M-07219-R2

FABRICANTE: Syntofarma S.A., con domicilio en Bogotá.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Consérvese a temperatura no mayor a 30°C protegido de la luz y la humedad.