

INFORME DE FARMACOLOGÍA

PRODUCTO: Ciprofibrato tabletas 100mg

INDICACIONES: Trastornos primarios graves del metabolismo de los lípidos, con aumento predominante de los triglicéridos, cuando no es posible rebajar adecuadamente la concentración de lípidos en el suero mediante la dieta u otras modificaciones del medio de vida. En el aumento secundario grave de los triglicéridos que es imposible de combatir con el tratamiento de la enfermedad primaria (como diabetes mellitus y la gota) y si no responde a la dieta u otras modificaciones del medio de vida.

VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral

POSOLOGÍA: Dosis usual: 100mg una vez al día.

CONTRAINDICACIONES, PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: Hipersensibilidad al medicamento, niños menores de doce (12) años, embarazo y lactancia. Adminístrese con precaución en pacientes con insuficiencia renal y/o hepática y síndrome nefrótico. Producto de uso delicado. Adminístrese bajo prescripción y vigilancia médica.

REACCIONES ADVERSAS:

Comunes:

- Dermatológicas: alopecia, rash.
- Gastrointestinales: dolor abdominal, diarrea, indigestión, náusea, vómito.
- Musculoesquelético: mialgia.
- Neurológico: mareo, dolor de cabeza, somnolencia, vértigo.
- Otros: fatiga

Serios:

- Musculoesqueléticos: rabdomiólisis.