



ACETATO DE ALUMINIO Polvo Winthrop®

Polvo medicado para uso tópico

Astringente

COMPOSICIÓN: Cada 100g de polvo contienen sulfato de aluminio 51,80 g, acetato de calcio 36,45g, excipientes, c.s.p., 100,00g.

INDICACIONES: ACETATO DE ALUMINIO Winthrop® en polvo es un astringente para uso externo. No es para uso Oftálmico.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS: Hipersensibilidad al medicamento.

INSTRUCCIONES DE USO: Viértase el polvo de un sobre en un cuarto o medio litro de agua fría, caliente o tibia (o según el médico indique). Agítase el líquido antes de usarse hasta que tome un aspecto lechoso, nunca debe colarse. Al usar compresas éstas deben mantenerse flojas para facilitar que se empapen bien ya que deben ser remojadas cada 15 ó 30 minutos. Por lo general el tratamiento se continúa durante 4 a 8 horas (o según el médico lo indique). Deseche el líquido sobrante después de cada uso.

ALMACENAMIENTO: Conserve a temperatura inferior a 30°C, protegido de la luz y la humedad.

PRESENTACIÓN: Caja por 25 sobres (Reg. San. INVIMA 2005M-0004255).

Winthrop®: Genéricos con calidad de multinacional, es la división de medicamentos genéricos de SANOFI. Información prescriptiva completa a disposición del médico en la Dirección Médica de SANOFI: Transversal 23 N°97-73, Piso 9, Ed. City Business, Tel: (1) 621 4400, Fax: (1) 744 4237. Bogotá, D.C.