

Tabletas
ALPRAZOLAM

COMPOSICION

Cada TABLETA contiene 0.5 mg de alprazolam.

PROPIEDADES FARMACOLOGICAS

"FARMACOCINETICA: Es una benzodiazepina del grupo de las triazolobenzodiazepinas, con vida media intermedia de alrededor de 12 a 15 horas, y una biodisponibilidad de 80%; la absorción es rápida con: — Efecto clínico máximo de 1 a 1,5 horas después de una dosis oral. — El pico plasmático alcanza 14,4 ng/ml por vía oral. La vida media en adulto mayor es de 19 horas. Se une en un 80% a proteínas séricas. Es eliminado por biotransformación y sus metabolitos son excretados principalmente por vía renal (80%). El alcohol, la insuficiencia hepática y la insuficiencia renal modifican la farmacocinética de alprazolam."

INDICACIONES

"Problemas funcionales y manifestaciones somáticas asociadas a la ansiedad. Ansiedad bajo todas las formas, asociadas o no a dificultades en la deglución. Cuadros de pánico. Ansiedad y depresión simultánea."

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS

"Alergia conocida a las benzodiazepinas. Insuficiencia respiratoria severa. Glaucoma agudo de ángulo estrecho. Embarazo y lactancia. Con ketoconazole e itraconazole ya que estas medicaciones deterioran significativamente el metabolismo oxidativo mediado por el citocromo P-450 3A (CYP 3A)."

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

"Evaluar el riesgo-beneficio del tratamiento en los casos de antecedentes de convulsiones o epilepsia, hipoalbuminemia, miastenia gravis, enfermedades orgánico-cerebrales, enfermedad pulmonar obstructiva crónica severa, apnea del sueño, antecedentes de abuso de sustancias. El riesgo de dependencia del alprazolam, incluyendo el complejo de síntomas de abstinencia, es más severo en pacientes tratados con dosis altas (más de 4 mg diarios) y por periodos de tiempo prolongados (8 a 12 semanas) que después de tratamientos de corta duración. Debido a sus efectos depresores sobre SNC, los pacientes tratados con alprazolam deben ser prevenidos de participar en áreas de riesgo o actividades que requieren un alerta mental completa, como operar máquinas o manejar vehículos."

EFFECTOS ADVERSOS

"Los efectos colaterales se observan generalmente al comienzo del tratamiento y habitualmente desaparecen durante el transcurso del mismo. Reacciones adversas frecuentes SNC: somnolencia, sensación de cabeza liviana, cefaleas. Gastrointestinales: sequedad de boca, diarrea y constipación."