



AMITRIPTILINA Winthrop®

Tabletas

Antidepresivo.

DESCRIPCIÓN: AMITRIPTILINA Winthrop® es un medicamento que pertenece al grupo de los antidepresivos tricíclicos (amina terciaria). Agente antimigrañoso profiláctico.

COMPOSICIÓN: Cada tableta contiene amitriptilina clorhidrato 25 mg.

PROPIEDADES: Aumenta la concentración sináptica de serotonina y/o norepinefrina en el sistema nervioso central por inhibición de la recaptación por la membrana de la neurona presináptica.

INDICACIONES: Tratamiento de enfermos con depresión moderada a grave. La AMITRIPTILINA Winthrop® es un agente antidepresivo.

DOSIFICACIÓN: Adultos: inicial 50-75 mg (ancianos y adolescentes 25-50 mg) al día, en tomas repartidas o en dosis única al acostarse, aumentándose gradualmente hasta un máximo de 150 mg-200 mg; dosis de mantenimiento 50 mg-100 mg al día.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS: Hipersensibilidad al medicamento, embarazo, niños, infarto cardíaco reciente. Adminístrese con precaución en enfermedad cardiovascular, hipertiroidismo, insuficiencia hepática, antecedentes de epilepsia, glaucoma, retención urinaria, hipertrofia prostática o constipación y con antecedentes de ingestión y/o concomitante con inhibidores de la MAO. Embarazo y lactancia.

REACCIONES ADVERSAS: Los efectos anticolinérgicos pueden ser severos. Puede producir sedación moderada a severa (aunque se presenta tolerancia a estos efectos). No está definida la frecuencia. SCV: Hipotensión ortostática, taquicardia, cambios inespecíficos en el ECG, cambios en la conducción AV, y raramente cardiomiopatía, IM, ACV, bloqueo, arritmias, síncope, hipertensión, palpitaciones. SNC: Inquietud, mareo, insomnio, fatiga, ansiedad, disminución cognitiva, convulsiones, síntomas extrapiramidales, coma, alucinaciones, confusión, desorientación, falla en la coordinación, ataxia, cefalea, pesadillas, hiperpirexia. Dermatológicas: Alopecia, fotosensibilidad, rash alérgico, urticaria. Endocrino/metabólico SSIADH GI: Anorexia, aumento de peso, diarrea, disgeusia, estomatitis, estreñimiento, íleo paralítico, lengua "negra", náusea, vómito, xerostomía. GU: Retención urinaria. Hematológico: Depresión de médula ósea, eosinofilia, púrpura. Ocular: Aumento de presión intraocular, midriasis, visión borrosa. Ótico: Tinnitus. Neuromuscular: Adormecimiento, debilidad, neuropatía periférica, parestesias, temblor. Misceláneos: Diaforesis, reacciones de retirada (cefalea, malestar, náusea). Se han reportado síndrome neuroléptico maligno y síndrome serotoninérgico (raros).



PRESENTACIÓN: Caja por 30 y 100 tabletas de 25 mg, (Reg. San. N° INVIMA 2005 M-002794-R1)

Winthrop®: Genéricos con calidad de multinacional, es la división de medicamentos genéricos de SANOFI. Información prescriptiva completa a disposición del médico en la Dirección Médica de SANOFI: Transversal 23 N°97-73, Piso 9, Ed. City Business, Tel: (1) 621 4400, Fax: (1) 744 4237. Bogotá, D.C.