

ATENOLOL

COMPOSICION

Cada TABLETA contiene 100 mg de atenolol.

DESCRIPCION

"Antagonista beta1-selectivo carente de actividad simpaticomimética intrínseca. Mecanismo de acción: Sobre los receptores adrenérgicos beta1 en el corazón; su acción antihipertensiva no es clara. Reduciendo el ritmo cardiaco y la contractilidad reduce los síntomas de la angina."

INDICACIONES

"Antianginoso, antiaritmico y antihipertensor. Usos no registrados reportados en estudios: Retirada aguda del alcohol y profilaxis de migraña. Categoría en embarazo: D. Categoría en embarazo: Cruza la placenta; persistente beta-bloqueo y bradicardia y retardo de crecimiento intrauterino (éste puede relacionarse con la hipertensión materna). Lactancia: Entra en la leche/uso con precaución."

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS

"Hipersensibilidad al fármaco o a alguno de los componentes; bradicardia sinusal, disfunción del nodo sinusal. Bloqueo AV mayor a primer grado (excepto en pacientes con marcapasos artificial funcionando); shock cardiogénico; ICC no compensada; edema pulmonar; embarazo."

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

"La seguridad y eficacia en niños no ha sido establecida. Adminístrese con cuidado en falla cardíaca compensada; debe monitorearse por un empeoramiento de la condición (la eficacia del atenolol en ICC no se ha establecido). No debe interrumpirse abruptamente (especialmente en pacientes con revascularización), sino disminuirse gradualmente para evitar taquicardia aguda, hipertensión y/o isquemia. Usar con cuidado al usar beta-bloqueadores con verapamilo o diltiazem; la bradicardia o bloqueo cardíaco pueden presentarse. Evite uso concurrente de verapamilo IV y beta-bloqueador. Evitar en enfermedad broncoespástica (asma) y enfermedad vascular periférica (puede agravar la insuficiencia arterial). Atenolol (con selectividad B1) ha sido usado con cuidado en asma con monitoria. Usese con cuidado en diabéticos, puede enmascarar síntomas hipoglicémicos. Puede enmascarar signos de tirotoxicosis. Puede amenazar al feto cuando se da en embarazo. Usar con cuidado en falla renal (ajustar la dosis). Usar con cuidado con anestésicos (depresión miocárdica). Precaución en miastenia gravis."

074

EFFECTOS ADVERSOS

1-10%. SCV: Angina, bloqueo AV de 2o. y 3er. grado, bradicardia persistente, claudicación intermitente, edema, hipotensión postural, ICC, fenómeno de Raynaud. SNC: Alteraciones del ánimo, cefalea, confusión, depresión, fatiga, insomnio, letargo, mareo, pesadillas, psicosis. GI: Diarrea, estreñimiento, náusea. GU: Impotencia. Misceláneas: Frialdad de las extremidades. < 1%: Alopecia, alucinaciones, ANAs positivos, disnea, enfermedad de Peyronie, enzimas hepáticas elevadas, rash psoriatiforme, síndrome lúpico, trombocitopenia, sibilancias. Interacciones con fármacos Aumento de efecto/tóxico: El atenolol puede aumentar los efectos de otras drogas que disminuyen la conducción AV (digoxina, verapamilo, diltiazem), alfa-bloqueadores (prazosin, terazosin), y estimulantes alfa adrenérgicos (adrenalina, fenilefrina). El atenolol puede enmascarar la taquicardia de la hipoglicemia por insulina e hipoglicemiantes orales. En pacientes que reciben terapia concurrente, el riesgo de crisis hipertensiva se ve incrementado cuando la clonidina o el beta-bloqueador es suspendido. La reserpina ha mostrado mejorar el efecto del atenolol. Los beta-bloqueadores pueden incrementar la acción o niveles de etanol, disopiramida, relajantes musculares no despolarizantes, y teofilina, aunque los efectos son difíciles de predecir. Disminución de efecto: Sales de aluminio, barbitúricos, sales de calcio, colestiramina, colestipol, AINEs, penicilinas (ampicilina), rifampicina, salicilatos y sulfpirazona, debido a la biodisponibilidad y niveles plasmáticos disminuidos. Los beta-bloqueadores pueden disminuir el efecto de sulfonilureas. Consideraciones dietarias: Los alimentos reducen las concentraciones séricas de atenolol. Evite efedra, yohimbé, ginseng (pueden empeorar la hipertensión). Evite el ajo (incrementa el efecto antihipertensivo). Información al paciente: Manténgase en el régimen prescrito. Cuidado con hipotensión postural; debe evitar la interrupción abrupta de la droga; tómese a la misma hora cada día; puede enmascarar la hipoglicemia en pacientes diabéticos en tratamiento. Reportar si ocurre algún efecto adverso; usar con precaución al manejar vehículos o al hacer tareas que requieran atención. "

POSOLOGIA Y DOSIFICACION

1 tableta diaria.