



ATORVASTATINA 20mg TABLETAS RECUBIERTAS

INDICACIONES: Coadyuvante en el manejo de las dislipoproteinemias

DOSIFICACION: Oral. Adultos: Inicial: 10 mg/día; máx. 80 mg/día. Ajuste de dosis a intervalos de 4 o más semanas. Niños >10 años: 10 mg/día, con ajuste de dosis hasta 20 mg/día.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS: Hipersensibilidad a los componentes, enfermedad hepática o elevación persistente de las transaminasas séricas (+ de 3 veces el límite normal superior), embarazo y lactancia. Utilícese con precaución en pacientes con historia de enfermedad hepática o de consumo importante de alcohol. Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo adecuado y no tener planes de quedar embarazada.

INTERACCIONES: Véase Advertencias y precauciones Además: Niveles plasmáticos aumentados por: zumo de pomelo. Aumenta concentraciones plasmáticas de: noretindrona y etinilestradiol. Con digoxina, warfarina, monitorización de forma adecuada. Riesgo de rabdomiólisis con: ác. fusídico.

Embarazo

Contraindicado. Las mujeres en edad fértil deben emplear medidas adecuadas anticonceptivas. Estudios en animales han evidenciado que los inhibidores de la HMG-CoA reductasa pueden influir en el desarrollo de los embriones o fetos.

Lactancia

Contraindicado durante la lactancia. En ratas, las concentraciones plasmáticas de atorvastatina y sus metabolitos activos eran similares a las encontradas en la leche. Se desconoce si este fármaco o sus metabolitos se excretan en la leche humana.

REACCIONES ADVERSAS:

Nasofaringitis; dolor faringolaríngeo, epistaxis; estreñimiento, flatulencia, dispepsia, náuseas, diarrea; reacciones alérgicas; hiperglucemia; dolor de cabeza; mialgias, artralgias; dolor en las extremidades, dolor musculoesquelético, espasmos musculares, hinchazón en las articulaciones; dolor de espalda; test de función hepática anormal, aumento de CPK sanguínea. Existe el riesgo de enfermedad pulmonar intersticial.



MECANISMO DE ACCION:

Inhibe de forma competitiva la HMG-CoA reductasa, enzima que limita la velocidad de biosíntesis del colesterol, e inhibe la síntesis del colesterol en el hígado.

PRESENTACION: Caja por 10 Tabletas de 10 mg (Reg. San. No. INVIMA 2001M-0000570). Caja por 10 Tabletas de 20 mg (Reg. San. No. INVIMA 2006M-0005832). Caja por 10 Tabletas de 40 mg (Reg. San. No. INVIMA 2006M-0006092)

Winthrop® es la línea de genéricos del grupo sanofi-aventis. Información prescriptiva completa a disposición del médico en la Dirección Médica de sanofi-aventis de Colombia S.A. Transversal 23 N° 97-73, Piso 9, Ed. City Business, Tel: (1) 621 4400, Fax: (1) 744 4237. Bogotá, D.C.