



## INFORME DE FARMACOLOGÍA

### PRODUCTO

Atorvastatina 40mg tabletas recubiertas

### INDICACIONES

Coadyuvante en el manejo de las dislipoproteinemias.

### VIA DE ADMINISTRACIÓN

Oral

### POSOLOGÍA

Antes de empezar el tratamiento, el paciente debe llevar una dieta estándar baja en colesterol y debe continuar con ella durante el tratamiento. Las dosis deben individualizarse de acuerdo con los valores basales del colesterol LDL, el objetivo del tratamiento y la respuesta del paciente. La dosis inicial habitual es de 10 mg una vez al día. El ajuste de la dosis debe hacerse en intervalos de 4 o más semanas. La dosis máxima es de 80 mg una vez al día.

### CONTRAINDICACIONES, PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Hipersensibilidad a sus componentes, enfermedad hepática o elevación persistente de las transaminasas séricas (más de tres veces el límite normal superior), embarazo y lactancia. Utilícese con precaución en pacientes con historia de enfermedad hepática o de consumo importante de alcohol. Las mujeres de edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo adecuado y no tener planes de quedar embarazadas.

### REACCIONES ADVERSAS

#### Infecciones e infestaciones

Frecuente: nasofaringitis

#### Trastornos de la sangre y del sistema linfático

Raros: trombocitopenia

#### Trastornos del sistema inmunológico

Frecuentes: reacciones alérgicas.

Muy raras: anafilaxia.

#### Metabolismo y trastornos de la alimentación

Frecuentes: hiperglucemia

Poco frecuentes: hipoglucemia, aumento de peso, anorexia

#### Trastornos psiquiátricos

Poco frecuentes: pesadillas, insomnio



Trastornos del sistema nervioso

Frecuentes: dolor de cabeza

Poco frecuentes: mareo, parestesia, hipoestesia, alteraciones del gusto, amnesia

Raras: neuropatía periférica

Trastornos oculares

Poco frecuentes: visión borrosa.

Raras: alteración visual.

Trastornos del oído y del laberinto

Poco frecuentes: acúfenos.

Muy raros: pérdida de audición.

Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos

Frecuentes: dolor faringolaríngeo, epistaxis.

Trastornos gastrointestinales

Frecuentes: estreñimiento, flatulencia, dispepsia, náuseas, diarrea.

Poco frecuentes: vómitos, malestar abdominal, eructos, pancreatitis.

Trastornos hepatobiliares

Poco frecuente: hepatitis. Raras: colestásis.

Muy raras: insuficiencia hepática. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo

Poco frecuentes: urticaria, erupción cutánea, prurito, alopecia.

Raras: edema angioneurótico, erupción ampollosa (incluyendo eritema multiforme), síndrome de Stevens-Johnson y necrosis epidérmica tóxica.

Trastornos musculo esqueléticos y del tejido conjuntivo

Frecuentes: mialgia, artralgia, dolor en las extremidades, espasmos musculares, inflamación de las articulaciones, dolor de espalda

Poco frecuentes: dolor de cuello, fatiga muscular

Raras: miopatía, miositis, rabdomiolisis, tendinopatía, a veces complicada con rotura

Trastornos del aparato reproductor y de la mama

Muy raras: ginecomastia

Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración

Poco frecuentes: malestar, astenia, dolor de pecho, edema periférico, fatiga, pirexia

Exploraciones complementarias

Comunes: análisis de función hepática anormales, aumento de la creatinquinasa en sangre

Poco comunes: glóbulos blancos en orina positivo.