

INFORMACION FARMACOLÓGICA

PRODUCTO: Candesartán 16mg tabletas

INDICACIONES: Tratamiento de la hipertensión.

VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral

POSOLOGIA: La dosis inicial recomendada y la dosis normal de mantenimiento es de 8 mg una vez al día. La mayor parte del efecto antihipertensivo se alcanza en 4 semanas. En aquellos pacientes en los que la presión arterial no se controle adecuadamente, la dosis puede aumentarse a 16 mg una vez al día y hasta un máximo de 32 mg una vez al día. La terapia deberá ajustarse de acuerdo con la respuesta de la presión arterial.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS:

Hipersensibilidad a alguno de los componentes. Embarazo y lactancia. No debe emplearse durante el embarazo, debido a los posibles efectos sobre el niño. En el caso en el que el tratamiento se considere esencial, la lactancia deberá interrumpirse. Estenosis de la arteria renal, reducción del volumen intravascular, uso concomitante de diuréticos ahorradores de potasio. La combinación de Aliskireno con IECA o ARA II en pacientes con insuficiencia renal moderada-grave o diabetes está contraindicada. No indicado en niños menores de 15 años. No utilizar terapia combinada con medicamentos que actúan sobre el SRA (IECA, ARA II o Aliskireno), excepto en aquellos casos que se considere imprescindible. En estos casos, el tratamiento debe llevarse a cabo bajo la supervisión de un médico con experiencia en el tratamiento de este tipo de pacientes, vigilando estrechamente la función renal, el balance hidroelectrolítico y la tensión arterial. No se recomienda el uso de la terapia combinada de IECA con ARA II, en particular en pacientes con nefropatía diabética.

REACCIONES ADVERSAS:

Infecciones e infestaciones

Frecuente: Infección respiratoria

Trastornos de la sangre y del sistema linfático

Muy raras: Leucopenia, neutropenia y agranulocitosis

Trastornos del metabolismo y de la nutrición

Muy raras: Hiperpotasemia, hiponatremia

Trastornos del sistema nervioso

Frecuente: Mareo/vértigo, cefalea

Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos

Muy raras: Tos



Trastornos gastrointestinales

Muy raras: Náuseas

Trastornos hepatobiliares

Muy raras: Aumento de enzimas hepáticas, función hepática anormal o hepatitis

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo

Muy raras: Angioedema, erupción cutánea, urticaria, prurito

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo y óseos

Muy raras: Dolor de espalda, artralgia, mialgia

Trastornos renales y urinarios

Muy raras: Alteración renal, incluyendo insuficiencia renal en pacientes susceptibles