

**COMPLEJO B TABLETAS RECUBIERTAS.**

**Indicaciones:** deficiencias de vitaminas del complejo B.

**vía de administración:** Oral.

**Contraindicaciones y advertencias:** sensibilidad a sus componentes. No administrarse más de la dosis diaria sugerida pues puede ocasionar hipervitaminosis.

**Interacciones:** debida a vitamina B1: absorción disminuida por alcohol. Debidas a vitamina B6: acelera metabolismo periférico, y reduce eficacia de: levodopa (salvo asociación con carbidopa; dosis máxima de vitamina B6 500 mg/día con levodopa sola). Reduce concentración plasmática de: fenobarbital y fenitoína. Antagonizada por: penicilamina, hidralazina, cicloserina, etionamida, anticonceptivos orales, inmunosupresores (corticosteroides, ciclosporina), mayor fotosensibilidad con amiodarona. Debidas a vitamina B12: antagonismo con: folatos (enmascaran efectos hematológicos por la deficiencia vitamínica pero exacerban efectos neurológicos).

**Embarazo y lactancia:** uso no recomendado en embarazo. Tiamina, piridoxina y cianocobalamina se distribuyen en leche materna, por lo tanto, no se recomienda administrar en madres durante el periodo de lactancia.

**Reacciones Adversas:** Cambio en la coloración de la orina, parestesias y/o alteraciones sensitivas, somnolencia, parestesias y/o alteraciones sensitivas, somnolencia, erupción cutánea, reacciones de hipersensibilidad, náuseas y vómitos.

**Registro sanitario:** R.S. INVIMA 2005 M-08646-R2.

**Presentaciones Comerciales:** Caja por 100, 250, 10, 200,300, 600 y 900 tabletas recubiertas.