

## INFORMACIÓN FARMACOLÓGICA

**DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral, Adultos y adolescentes (a partir de 12 años): un comprimido una vez al día, con o sin alimentos para el alivio de los síntomas asociados con la rinitis alérgica (incluida rinitis alérgica intermitente y persistente) y urticaria.

La experiencia sobre el uso de desloratadina en adolescentes de 12 a 17 años de edad en ensayos clínicos de eficacia es limitada

La rinitis alérgica intermitente (presencia de síntomas durante menos de 4 días a la semana o durante menos de 4 semanas) se deberá controlar según la evaluación de la historia de la enfermedad del paciente pudiéndose interrumpir el tratamiento después de la resolución de los síntomas, y reiniciarse si vuelven a aparecer.

En la rinitis alérgica persistente (presencia de síntomas durante 4 o más días a la semana y durante más de 4 semanas) se puede proponer a los pacientes el tratamiento continuado durante los periodos de exposición al alérgeno.

**INDICACIONES:** antihistamínico no sedante de dosis única diaria.

**CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS:** Hipersensibilidad a la sustancia activa o a cualquiera de sus componentes. No se ha establecido la eficacia ni la seguridad de Desloratadina tabletas en niños menores de 12 años de edad. Efectos sobre la capacidad de conducir vehículos y usar maquinaria: no se han observado efectos sobre la capacidad para conducir vehículos y usar maquinaria, sin embargo se recomienda hacer un llamado al cuidado en los pacientes que requieran ánimo vigilante.

**Reacciones Adversas:** Al igual que todos los medicamentos, Desloratadina puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. En adultos, los efectos adversos fueron aproximadamente los mismos que con un comprimido que no contiene principio activo.

Sin embargo, la fatiga, sequedad de boca y dolor de cabeza se comunicaron más frecuentemente que con un comprimido que no contiene principio activo.

En adolescentes, el dolor de cabeza fue la reacción adversa comunicada más frecuentemente.

Durante la comercialización de Desloratadina, se han comunicado muy raramente casos de reacciones alérgicas graves (dificultad al respirar, respiración con pitos, picor, ronchas cutáneas e hinchazón) y erupción cutánea. También se han comunicado muy raramente palpitaciones, latidos cardíacos rápidos, dolor de estómago, náuseas (ganas de vomitar), vómitos, estómago revuelto, diarrea, mareo, somnolencia, dificultad para

dormir, dolor muscular, alucinaciones, convulsiones, agitación con aumento de movimiento corporal, inflamación del hígado y alteración en las pruebas de la función hepática.

**Genfar S.A.**  
Nit: 817.001.644 - 1

**DIRECCIÓN GENERAL**

Calle 20A No. 44-70 (Bogotá D.C. - Colombia)  
PBX: (57) (1) 368 0077 - 368 0472 Fax: 368 3193  
368 3850 - 268 4552

**PLANTA BOGOTA**

Calle 20B No. 44 - 61 (Bogotá D.C. - Colombia)  
PBX: (57) (1) 368 0077 ext: 2136

**PLANTA VILLA RICA**

KM. 43 vía Panamericana Cali - Popayán  
Parque Industrial Caucalesa, Villa Rica  
(Cauca Colombia) PBX: (57) (2) 390 5400 Fax 390 5455