



INFORMACIÓN FARMACOLÓGICA

NAPROXENO 500 mg TABLETAS

DESCRIPCIÓN:

Naproxeno 500 mg Tabletas Winthrop® es un AINE derivado del ácido propiónico muy bien tolerado. Inhibe la ciclooxigenasa.

COMPOSICIÓN:

Cada tableta contiene Naproxeno 500 mg.

INDICACIONES:

Analgesico, Antiinflamatorio No Esteroide.

DOSIFICACION:

500 a 1.000 mg diarios repartidos en 2 dosis con intervalo de 12 horas se puede incrementar hasta 1.500 mg/día para el manejo de las exacerbaciones y por periodos no mayores de 2 semanas. Mantenimiento: 375 a 1.000 mg/día cada 12horas.

La dosis efectiva más baja debe utilizarse durante el menor tiempo necesario para aliviar los síntomas. Si tiene una infección, consulte a un médico lo más pronto posible si los síntomas (como fiebre o dolor) persisten o empeoran.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS:

Contraindicaciones: hipersensibilidad al principio activo o a sus excipientes. Broncoespasmo, rinitis aguda, pólipos nasales y edema angioneurotico. Reacciones alérgicas a ácido acetil salicílico o ames, úlcera péptica, sangrado gastrointestinal y antecedente de enfermedad ácido-péptica, disfunción hepática severa.

Advertencias: tercer trimestre de embarazo y lactancia. Insuficiencia renal grave (depuración de creatinina <30 ml/mm). Insuficiencia hepática moderada. Se recomienda que debe iniciar tratamiento con las dosis más bajas. El uso concomitante con el ácido acetil salicílico (asa) incrementa el riesgo de úlcera gastrointestinal y sus complicaciones. En el caso del ácido acetil salicílico (asa) debe evitarse su uso en niños con enfermedades virales agudas. Enmascaramiento

PI: CO_NAPROXENO_TAB_500MG_PI_L_
Clean: VV-LBL-0202236
Annotated: VV-LBL-0202235



INFORMACIÓN FARMACOLÓGICA

de los síntomas de las infecciones, Naproxeno 500 mg puede enmascarar los síntomas de la infección, lo que puede retrasar el inicio del tratamiento adecuado y, por lo tanto, empeorar el resultado de la infección. Esto se ha observado en la neumonía bacteriana en la comunidad y en complicaciones bacterianas de la varicela. Cuando se administra Naproxeno 500 mg para mejorar la fiebre o el dolor relacionado con la infección, se recomienda vigilar la infección. En entornos no hospitalarios, el paciente debe consultar a un médico si los síntomas persisten o empeoran.

INTERACCIONES:

Debido a la alta unión de naproxeno a proteínas plasmáticas, se debe monitorear los pacientes que simultáneamente reciben hidantoína, anticoagulantes o sulfonilureas.

Los AINE's inhiben el efecto natriurético de la furosemida y la depuración renal del litio con el consiguiente incremento de la concentración plasmática del litio.

Naproxeno igual que otros AINE's puede reducir el efecto antihipertensivo de los betabloqueadores.

Probenecid incrementa la concentración plasmática de naproxeno y prolonga su vida media en forma importante. Naproxeno reduce la secreción tubular de metotrexate con un posible incremento en el riesgo de toxicidad del metotrexate. Igual que con otros AINE's naproxeno puede incrementar el riesgo del daño renal asociado con el uso de IECA.

Naproxeno puede interferir el metabolismo de zidovudina, por lo tanto, puede ser necesario reducir las dosis de zidovudina. Naproxeno se debe suspender 48 horas antes de los test de función adrenal porque puede interferir con la técnica analítica para 17 cetosteroides, también interfiere con la técnica analítica de 5.

REACCIONES ADVERSAS

Cefalea, dolor epigástrico, náusea, edema periférico, malestar abdominal, tinnitus y vértigo, anafilaxia, anemia aplásica, anemia hemolítica, angioedema, falla renal, convulsiones, granulocitopenia, hematuria, nefritis glomerular, nefritis intersticial, necrosis papilar renal, hipercaliemia, rash cutáneo, síndrome de Stevens Johnson, úlcera intestinal.

Naproxeno 500 mg puede enmascarar los síntomas de la infección, lo que puede retrasar el inicio del tratamiento adecuado y, por lo tanto, empeorar el resultado de la infección (incluyendo la neumonía bacteriana adquirida en la comunidad y complicaciones bacterianas de la varicela).



INFORMACIÓN FARMACOLÓGICA

PRESENTACION:

Caja por 10 y 300 tabletas.

Winthrop es la línea de genéricos del grupo sanofi-aventis. Información prescriptiva completa a disposición del médico en la Dirección Médica de sanofi-aventis de Colombia SA. Transversal 23 N° 97-73. Piso 9, Ed. City Business, Tel: (1) 621 4400, Fax: (1) 744 4237. Bogotá, D.C.

REVISIÓN LOCAL

Octubre / 2020

REFERENCIA

LRC Decision GCDS V1. Fecha revisión: 27-Abril-2012

GCDS V2.0-LRC Decision GCDS V2 dated 30-Jul-2020 - LRR7161. Revisión Octubre 2020.