

INFORME DE FARMACOLOGÍA

INDICACIONES: "tratamiento de la giardiasis, criptosporidiasis intestinal, amebiasis, ascaridiasis y tricocefalosis, tratamiento de la diarrea causada por cryptosporidium parvum y giardia lamblia.

VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral

POSOLOGÍA: Criptosporidiosis: 500mg administrados por vía oral cada 12 horas con alimentos por 3 días. Giardiasis: 500mg administrados por vía oral cada 12 horas con alimentos por 3 días.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad al medicamento, embarazo y lactancia, niños menores de un año de edad. Puede producir náuseas, algunas veces acompañada de cefalea, anorexia y ocasionalmente vómito, malestar epigástrico inespecífico y dolor abdominal tipo cólico. Se debe administrar con precaución en pacientes con enfermedad hepática y renal. Contiene tartrazina que puede producir reacciones alérgicas, tipo angioedema, asma, urticaria y shock anafiláctico.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES: Nitazoxanida puede exacerbar la gastritis, en particular el dolor epigástrico, por lo que se sugiere se administre junto con los alimentos. Ocasionalmente puede presentarse pigmentación amarilla en conjuntivas y en orina, que desaparecen al suspender el tratamiento. No fraccionar con fines de dosificación.

REACCIONES ADVERSAS: Gastrointestinales: dolor abdominal, diarrea, náusea, vómito. Neurológicos: dolor de cabeza.