



| INFORMACION TÉCNICA | FECHA DE ELABORACION | REGISTRO |
|----------------------------------|----------------------|----------|
| GENFAR S.A VILLA RICA - CAUCA | MAYO DE 2008 | |

FARMACOLOGIA

SECNIDAZOL 500 mg TABLETAS RECUBIERTAS

INDICACIONES:

Secnidazol 1 g Tabletas Recubiertas, está indicado en el tratamiento de elección para un control eficaz, seguro y rápido de la amebiasis intestinal aguda y extraintestinal, giardiasis, tricomoniasis urogenital mixta, cervicovaginitis, vaginitis inespecífica o vaginosis bacteriana. También es activo contra *Helicobacter pylori*, causante de gastritis, duodenitis y úlcera péptica.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a los derivados del Imidazol, embarazo y lactancia.

ACCIONES FARMACOLOGICAS:

Secnidazol es un antiprotozoario derivado del 5-nitroimidazol. Su actividad afecta a *Entamoeba histolytica*, *Giardia lamblia*, *Tricomonas vaginalis*, también a *Gardnerella vaginalis*. La vida media plasmática del Secnidazol es de unas 25 horas. La eliminación, esencialmente es lenta (16% de la dosis ingerida se excreta en 72 horas). El Secnidazol atraviesa la barrera placentaria y se excreta en la leche materna.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:

Asociaciones que no se recomiendan son las siguientes:

- Con el Disulfiram.- Riesgo de aparición de brotes delirantes, con estados de confusión.
- Con el Alcohol.- Se produce efecto antabuse.
- Con la Warfarina.- Aumenta el efecto de los anticoagulantes orales y el riesgo de hemorragia.
- Medicamentos neurotóxicos.- Puede aumentar el efecto neurotóxico de estos medicamentos.

Genfar S.A.
NIT 817.001.644-1

Dirección General
Calle 206
No. 44-70
Bogotá, D.C. - Colombia
PBX: (57)(1)
348 0272 - 348 0472
Fax: 348 3193 - 348
3850 - 268 4552
A.A. 30406

**Complejo Farmacéutico
multiatlántico**
Km. 43 vía Panamericana,
Cali - Popayán, Parque
Industrial Caucaense,
Villa Rica
(Cauca - Colombia)
PBX: (57)(2) 390 9400
A.A. 30405

Regional Medellín
Calle 35 No. 638-31
barrio
Conquistadores
PBX: (57)(4)
265 9011
Fax: 351 1735
351 4720

Regional Cali
Avenida Pisoachto
No. 78-54 of. 405
Edificio
Centro Ejecutivo 78
Tels: (57)(2)
483 2208- 483 2552
331 9446 - 331 5328
Fax: 330 5506

**Regional
Barranquilla**
Carrera 54 No. 72-142
Piso 5
Edificio Corporativo
Tels/Fax: (57)(5)
358 5976 - 358 6945
358 7836

Líneas gratuitas: 01 8000 911666/444/333 www.genfar.com E-mail: genfar@genfar.com



| INFORMACION TÉCNICA | FECHA DE ELABORACION | REGISTRO |
|----------------------------------|----------------------|----------|
| GENFAR S.A VILLA RICA - CAUCA | MAYO DE 2008 | |

PRECAUCIONES:

- Evitar la ingesta de bebidas alcohólicas durante el tratamiento.
- Evitar la administración en los individuos que presenten antecedentes de discrasias sanguíneas.
- Embarazo: Los estudios realizados en animales no han puesto en evidencia efectos teratogénicos. En ausencia de datos precisos en humanos, estos resultados experimentales no permiten prejuzgar consecuencias.

INCOMPATIBILIDADES:

Ver interacciones medicamentosas.

REACCIONES ADVERSAS:

Las reacciones adversas más frecuentes con los derivados del Imidazol son las siguientes:

- Trastornos digestivos con náuseas, gastralgias, modificación del sabor (metálico), glositis, estomatitis.
- Urticaria.
- Leucopenia moderada, reversible con la suspensión del tratamiento.
- Rara vez: vértigos, fenómenos de descoordinación y de ataxia, parestesias, polineurosis sensitivo motriz.

ADVERTENCIAS:

Evitar la ingesta de bebidas alcohólicas durante el tratamiento o al menos hasta un día después de discontinuado el uso de este medicamento.

En tricomoniasis, prevenir la reinfección de la mujer tratando simultáneamente a la pareja sexual masculina y recomendándole el uso simultáneo de preservativos durante el tratamiento.

TRATAMIENTO EN CASO DE SOBREDOSIS:

No hay antídoto específico para el tratamiento de sobredosis del Secnidazol, por lo que debe ser sintomático y de soporte.

Genfar S.A.
NIT 817.007.644

Dirección General
Calle 20a
No. 44-70
(Bogotá, D.C. - Colombia)
P.BX: 857111
Tel: 268 0077 - 368 0472
Fax: 268 3190 - 368
1850 - 268 4552
A.A. 30406

Complejo Farmacéutico
multisite
Km. 43 vía Panamericana,
Cali - Popayan, Parque
Industrial Caucaleses,
Villa Rica
(Cauca - Colombia)
PBX: (57)(2) 390 5400
A.A. 30405

Regional Medellín
Calle 29 No. 430-31
barrio
Conquistadores
PBX: (57)(4)
265 9011
Fax: 351 1735
351 4720

Regional Cali
Avenida Páramocho
No. 78-54 of. 405
Edificio
Centro Ejecutivo 78
Tel: (57)(2)
683 2208 - 683 2552
331 5448 - 331 5328
Fax: 330 5506

Regional
Barranquilla
Carrera 54 No. 72-142
Piso 3
Edificio Corpavi
Tel/Fax: (57)(5)
358 9576 - 358 6965
358 7836

Líneas gratuitas: 01 8000 911666/444/333 www.genfar.com E-mail: genfar@genfar.com



| INFORMACION TÉCNICA | FECHA DE ELABORACION | REGISTRO |
|----------------------------------|----------------------|----------|
| GENFAR S.A VILLA RICA - CAUCA | MAYO DE 2008 | |

DOSIS Y VIAS DE ADMINISTRACION:

VIA DE ADMINISTRACION: Oral.

Dosis usual para adultos: 2 g como dosis única en una sola toma, preferiblemente después de la última comida.

Dosis usual pediátrica

- Niños de 5 a 7 años.- 500 mg en una sola toma.
- Niños de 8 a 9 años.- 750 mg en una sola toma.
- Niños de 10 a 12 años.- 1 g en una sola toma.

Genfar S.A.
NIT 817.001.644-1

Dirección General
Calle 20A
No. 44-70
Bogotá, D.C. - Colombia
Pbx: (57)11
368 0277 - 368 0472
Fax: 368 3103 - 368
8810 - 268 4952
A.A. 30406

**Complejo Farmacéutico
Muzilatingo**
Km. 43 -vía Panamericana,
Cali - Popayán, Parque
Industrial Caucaense,
Villa Rica
(Cauca - Colombia)
Pbx: (57)021 390 5400
A.A. 30405

Regional Medellín
Calle 73 No. 428-31
barrio
Conquistadores
Pbx: (57)46
265 9011
Fax: 351 1735
351 4720

Regional Cali
Avenida Pasancho
No. 78-54 of. 405
Edificio
Centro Ejecutivo 78
Pbx: (57)021
683 2208 - 683 2252
331 5448 - 331 5328
Fax: 330 5506

**Regional
Barranquilla**
Carrera 54 No. 72-142
Piso 5
Edificio Corbani
Pbx: (57)051
358 5976 - 358 6965
358 7834

Lineas gratuitas: 01 8000 911666/444/333 www.genfar.com E-mail: genfar@genfar.com