



INFORMACIÓN FARMACOLÓGICA

Dosis y vía de administración: Oral, La dosis normal de mantenimiento es 1 tableta de **TERAZOSINA 5 mg tabletas** una sola vez al día (lo que significa una sola dosis diaria de 5 mg de terazosina). En aquellos casos en que la respuesta clínica lo justifique la dosis puede aumentarse paulatinamente hasta un máximo de 2 tabletas al día de **TERAZOSINA 5 mg tabletas** (10 mg de terazosina), una sola vez al día, si se prescribe una dosis de mantenimiento diferente, el número de tabletas que usted tome será diferente. Compruebe las instrucciones de su médico para recordar cuantas tabletas necesita usted tomar. Debe tomar sus tabletas solamente una vez al día.

Indicaciones: Tratamiento de hipertensión leve a moderada. Coadyuvante en el tratamiento sintomático de la hipertrofia prostática benigna.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al medicamento, menores de 14 años, administrar con precaución en pacientes con enfermedad cardíaca severa, embarazo y lactancia.

Este medicamento contiene lactosa, los pacientes con problemas hereditarios raros de intolerancia a la galactosa, deficiencia de lactasa Lapp o mala absorción de glucosa-galactosa no deben tomar este medicamento.

Precauciones y Advertencias: El tratamiento debe iniciarse con dosis bajas de 1mg, por la posibilidad de producir síncope con pérdida del conocimiento con las primeras dosis. Producto de uso delicado. Adminístrese con precaución y bajo vigilancia médica.

Reacciones adversas: Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Efectos sistémicos: astenia (flojedad o debilidad) y dolor de cabeza.

Sistema cardiovascular: palpitaciones, hipotensión postural (sensación de mareo al incorporarse), síncope y taquicardia.

Desórdenes metabólicos: edema periférico (hinchazón de las extremidades) y aumento de peso.

Sistema nervioso: desvanecimiento, vértigo, descenso de la lívido y somnolencia.

Sistema respiratorio: disnea (sensación de falta de aire), rinitis (congestión nasal).

Sistema urogenital: impotencia y eyaculación retrógrada. En mujeres postmenopáusicas: incontinencia urinaria.

Órganos de los sentidos: visión borrosa.

De todos ellos los síntomas más habituales son astenia (flojedad o debilidad), visión borrosa, vértigo, hipotensión postural (sensación de mareo al incorporarse), congestión nasal, náuseas, edema periférico (hinchazón de las extremidades), impotencia y somnolencia, generalmente de intensidad media o moderada.

También se ha descrito la aparición de trombocitopenia (descenso del número de plaquetas), fibrilación auricular (arritmia del corazón) y priapismo (erección persistente y dolorosa del pene).

REVISIÓN LOCAL

Setiembre/2020

PI: CO_TERAZOSINA_TABLETAS_5MG_PI_L
Clean: VV-LBL-0195688
Annotated: VV-LBL-0195679

PIL ASOCIADO: CO_TERAZOSINA_TABLETAS_5MG_PI_L
Clean: VV-LBL-0197214
Annotated: VV-LBL-0197213



INFORMACIÓN FARMACOLÓGICA

REFERENCIA

INVIMA Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora - Acta 19 de 2008 Numeral 2.1.3

INVIMA SEMPB de la comisión revisora. Acta No. 06 de 2015

PI: CO_TERAZOSINA_TABLETAS_5MG_PI_L
Clean: VV-LBL-0195688
Annotated: VV-LBL-0195679

PIL ASOCIADO: CO_TERAZOSINA_TABLETAS_5MG_PI_L
Clean: VV-LBL-0197214
Annotated: VV-LBL-0197213