

## INFORME DE FARMACOLOGÍA

**PRODUCTO:** Tinidazol tabletas recubiertas 1g

**INDICACIONES:** Antiamebiano, tricomonocida

**VIA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral

**POSOLOGÍA:**

Amebiasis intestinal: Adultos: una dosis diaria de 2 gramos durante 2 ó 3 días o 500 mg dos veces al día durante 5 días. Si ocasionalmente, el tratamiento con dosis únicas diarias durante 3 días no fuera eficaz, deberá continuarse hasta 6 días y cuando el tratamiento de 5 días con dos dosis al día es ineficaz, éste puede ser continuado hasta un total de 10 días.

Tricomoniasis urogenital: Cuando se confirma una infección por Trichomonas vaginalis, se recomienda el tratamiento simultáneo de la pareja. Adultos (mujeres y hombres): Dosis única oral de 2 gramos de una sola vez, o bien en dos dosis (2 comprimidos cada vez) en un solo día.

**CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS:** Hipersensibilidad al medicamento, pacientes con trastornos neurológicos o con discrasias sanguíneas, lactancia y en los tres primeros meses de embarazo. Durante el tratamiento no se deben ingerir bebidas alcohólicas. En la promoción al cuerpo médico deberá advertirse que el tinidazol produce cáncer en animales de experimentación, por lo tanto se considera potencialmente peligroso en humanos.

**EMBARAZO Y LACTANCIA:** Está contraindicado durante el primer trimestre del embarazo y durante la lactancia.

**REACCIONES ADVERSAS:** Los efectos secundarios han sido generalmente poco frecuentes, leves y evolucionaron espontáneamente. Entre los efectos gastrointestinales figuran: náuseas, vómitos, anorexia, diarrea y sabor metálico.

En casos raros pueden aparecer reacciones de hipersensibilidad, ocasionalmente graves, en forma de erupciones cutáneas, prurito, urticaria y edema angioneurótico. Como sucede con fármacos estructuralmente relacionados, Tinidazol puede producir leucopenia transitoria. Otros efectos raros veces señalados son: cefaleas, fatiga, lengua saburral y orina oscura