

INFORME DE FARMACOLOGIA

Genfar S.A.
NIT 817.001.644-1

DIRECCIÓN GENERAL
Calle 20A No. 44-70 (Bogotá, D.C. - Colombia)
PBX: (57)(1) 368 0077 - 368 0472 Fax: 368 3193 - 368 3850 - 268 4552

COMPLEJO FARMACEUTICO MULTI LATINO
Km. 43 vía Panamericana Cali - Popayán, Parque Industrial Caucadesa, Villa Rica
(Cauca - Colombia) PBX: (57)(2) 390 5400 A.A. 4584 Fax: 390 5455

ISOCONAZOL 1% SOLUCIÓN TÓPICA

indicaciones: antimicótico.

Contraindicaciones: hipersensibilidad al isoconazol. Adminístrese con precaución en el primer trimestre de embarazo.

Advertencias y Precauciones: observaciones: evítese el contacto con los ojos cuando se aplique en la cara. Si durante el tratamiento con isoconazol solución se produce una desecación excesiva de la piel, se debe emplear adicionalmente una preparación grasa neutra. Para evitar reinfecciones se aconseja utilizar ropa interior de algodón, la cual se cambiará y hervirá diariamente. Las toallas y toallitas de aseo deberán cambiarse y hervirse también después de cada utilización. En las infecciones de espacios interdigitales muchas veces es aconsejable colocar una gasa con isoconazol entre los dedos de los pies o de las manos. Para que el tratamiento tenga éxito hay que practicarse regularmente una escrupulosa higiene, en especial el perfecto secado de las zonas interdigitales cuando los pies se encuentran afectados por hongos. Las medias deben cambiarse diariamente. Embarazo y lactancia: la experiencia con el uso de preparados que contienen isoconazol durante el embarazo no indica la existencia de riesgo teratogénico en humanos. se puede descartar cualquier efecto del isoconazol que pasa a través de la leche materna sobre el lactante, debida a su mínima absorción (menos del 10% de la dosis administrada) y a la corta duración del tratamiento. Adminístrese con precaución en el primer trimestre del embarazo.

Reacciones Adversas: bajo tratamiento con isoconazol crema pueden presentarse en casos aislados síntomas locales tales como prurito, ardor, eritema o vesiculación. Pueden presentarse reacciones alérgicas de la piel. R.S. INVIMA 2005 M-000894 R1.

Presentaciones comerciales. *Frasco por 20 ml.*