

INFORME DE FARMACOLOGÍA

PRODUCTO: Lincomicina inyectable 600mg/2mL

INDICACIONES: Infecciones causadas por germen sensibles a la lincomicina.

VIA DE ADMINISTRACIÓN: Parenteral

POSOLOGÍA:

Infeccion por Staphylococcus aureus: 600mg IM cada 24 horas; 600mg a 1g via IV cada 8-12 horas, máximo 8g/dia.

Enfermedad infecciosa Pnumococica: 600mg IM cada 24 horas; 600mg a 1g via IV cada 8-12 horas, máximo 8g/dia.

Enfermedad infecciosa Streptococica: 600mg IM cada 24 horas; 600mg a 1g via IV cada 8-12 horas, máximo 8g/dia.

CONTRAINDICACIONES, PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: Hipersensibilidad a la lincomicina y/o clindamicina, pacientes con estados diarreicos. Adminístrese con precaución en pacientes con disfunción hepática, agranulocitosis, trombocitopenia y leucopenia. Contiene alcohol bencílico, por lo que no debe usarse en lactantes y/o niños prematuros

REACCIONES ADVERSAS:

Comunes:

Gastrointestinales: colitis, diarrea, prurito.

Serios:

Cardiovascular: ataque cardiaco, disritmia cardiaca

Gastrointestinales: diarrea por Clostridium difficile

Inmunológicos: anafilaxis