

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
MEBENDAZOL 100 mg
TABLETAS

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento. Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo. Si tiene alguna duda, consulte a su médico. Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarles.

Este folleto contiene información sobre:

1. Indicaciones: ¿Qué es Mebendazol tabletas y para qué se utiliza?
2. Dosis y forma de administración: ¿Cómo se debe usar Mebendazol tabletas?
3. Antes de usar Mebendazol tabletas
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Mebendazol tabletas

Composición

Forma farmacéutica: tabletas

Cada tableta contiene:

Mebendazol 100 mg

Excipientes: Lactosa monohidrato, almidón, croscarmelosa sódica, lauril sulfato de sodio, celulosa microcristalina, sacarina sódica, povidona, color amarillo N°6, esencia de cereza polvo, estearato de magnesio, alcohol etílico 96%.

1. Indicaciones: ¿Qué es Mebendazol tabletas y para qué se utiliza?

Es un antihelmíntico efectivo contra:

Enterobius vermicularis (oxiuros), Ascaris lumbricoides (lombrices), Trichuris trichiura (tricocéfalos), Necator americanus, Ancylostoma duodenale (uncinarias), Strongyloides stercoralis, Teania solium, Taenia saginata (tenias).

A las dosis recomendadas se obtienen resultados excelentes en más del 90% de los casos, incluso en infecciones mixtas o de gravedad.

2. Dosis y forma de administración: ¿Cómo se debe tomar Mebendazol tabletas?

Vía de administración: Oral.

Dosis:

Una cucharadita de 5 mL cada 12 horas, por 3 días consecutivos.

Si toma más Mebendazol tabletas del que debe

Consulte inmediatamente a su médico o diríjase al servicio de urgencias del hospital más próximo acompañado de este prospecto.

Una **sobredosis** accidental podría producir **síntomas** como espasmos abdominales, náuseas, vómito y diarrea.

Aunque la duración máxima del tratamiento con Mebendazol es de 3 días, se han reportado casos aislados de disturbios en la función del hígado, hepatitis y neutropenia en pacientes que fueron tratados por padecimiento hidatídicos con dosis masivas por períodos de tiempo prolongados.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente a su médico.

No hay un antídoto específico. Se sugiere un lavado gástrico con una solución acuosa de permanganato de potasio de 20mg/100mL. Se puede administrar carbón activado.

Si olvidó tomar Mebendazol tabletas

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si interrumpe el tratamiento con Mebendazol tabletas

Recuerde tomar su medicamento. Su médico le indicará su dosis diaria y la duración de su tratamiento. No interrumpa su tratamiento antes.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, pregunte a su médico.

3. Antes de usar Mebendazol tabletas

3.1. Contraindicaciones: En qué casos no debe tomar Mebendazol tabletas

No tome Mebendazol tabletas:

- Si ha manifestado hipersensibilidad a la droga.
- Embarazo.
- Niños menores de 2 años.

3.2. Advertencias y precauciones

Antes de tomar el medicamento consulte a su médico.

El Mebendazol ha demostrado actividad embriotóxica y teratogénica en ratas y ratones a dosis oral simple, mismos que no han sido reportadas en el conejo, perro, oveja y caballo.

Uso en menores de 2 años:

La experiencia documentada en niños menores de 2 años es escasa y además existen reportes excepcionales de convulsiones en este grupo etario.

3.3. Interacciones:

El tratamiento concomitante con Cimetidina puede inhibir el metabolismo de Mebendazol en el hígado, resultando en un aumento en las concentraciones en plasma especialmente en tratamientos prolongados. Por lo tanto, se recomienda la determinación de dichas concentraciones a fin de permitir ajustes en la dosis.

3.4. Embarazo y lactancia

Al prescribir Mebendazol durante el embarazo deben presentarse los beneficios terapéuticos esperados, particularmente durante el primer trimestre. No se sabe si el Mebendazol es excretado en la leche humana. Por lo tanto debe tomarse las precauciones necesarias, cuando el Mebendazol se administre en mujeres en período de lactancia.

4. Posibles efectos adversos

Muy pocas reacciones secundarias han sido reportadas con el uso de Mebendazol, se ha reportado muy ocasionalmente dolor abdominal y diarrea transitoria, en casos de infestación masiva y expulsión de lombrices. Se han observado muy ocasionalmente reacciones de hipersensibilidad tales como exantema, rash, urticaria y angioedema.

5. Conservación de Mebendazol tabletas

Consérvese a temperatura no mayor a 30 ° C, protegido de la humedad y la luz.

No administrar si observa el empaque dañado o deteriorado.

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

Caducidad:

No utilice después de la fecha de caducidad que aparece en el envase.

Contenido del envase

Se presenta en caja de cartón por 60 tabletas en sistema blíster.

No todas las presentaciones se comercializan en todos los países.

Fabricado/Manufacturado por:

Genfar S.A., Parque Industrial Caucadesa, Km 43 Vía Panamericana, Villa Rica, Cauca, Colombia

Importado y/o distribuido por:

Ecuador: Sanofi-aventis del Ecuador S.A., Quito-Ecuador.