

581



Ampicilina 500mg Genfar®

CÁPSULA
Antibacteriano

INSERTO PARA EL PACIENTE

Lea todo el inserto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento.

- Conserve este inserto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarles.
- Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

CONTENIDO DEL INSERTO

1. Qué es AMPICILINA 500mg CÁPSULA y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar AMPICILINA 500mg CÁPSULA
3. Como tomar AMPICILINA 500mg CÁPSULA
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de AMPICILINA 500mg CÁPSULA
6. Información adicional

1. ¿QUÉ ES AMPICILINA 500mg CÁPSULA Y PARA QUÉ SE UTILIZA?

El nombre de su medicamento es Ampicilina Cápsulas. Pertenece al grupo de medicamentos denominados antibióticos de amplio espectro. Se usa para destruir bacterias que provocan infecciones en su organismo. Estas infecciones incluyen:

- Infecciones de las vías respiratorias (por ejemplo, infecciones de la nariz y garganta, neumonía, bronquitis)
- Infecciones del oído.
- Infecciones de las vías urinarias (por ejemplo, infecciones de la vejiga y la uretra).
- Infecciones gastrointestinales (por ejemplo infecciones de los intestinos).
- Fiebre tifoidea (una enfermedad infecciosa contraída al ingerir alimentos o beber agua contaminados con Salmonella).
- Infecciones ginecológicas y gonorrea (una enfermedad de transmisión sexual).
- Infecciones de la sangre (septicemia).
- Piel y partes blandas (por ejemplo, acné).
- Prevención de endocarditis (inflamación del revestimiento del corazón y sus válvulas) tras cirugía o procedimiento dental.
- Peritonitis (una inflamación del peritoneo, el tejido fino que reviste la pared interna del abdomen).
- Meningitis (inflamación de las membranas protectoras que cubren el cerebro y la médula espinal).

2. ¿QUÉ NECESITA SABER ANTES DE EMPEZAR A TOMAR AMPICILINA 500mg CÁPSULA?

No tome este medicamento si:

- ha tenido alguna vez una reacción alérgica a ampicilina, antibióticos betalactámicos o cualquier otra penicilina o antibiótico de tipo cefalosporina (véase los síntomas en la sección 4, Posibles efectos adversos)
- ha tenido alguna vez una reacción alérgica a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (véase la lista de componentes en la sección 6, Información adicional).

TIRO

Advertencias y precauciones

- Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar su medicamento si:
- padece problemas renales, ya que puede requerir una dosis inferior a la normal.
 - padece mononucleosis infecciosa o infección por citomegalovirus (CMV).
 - padece leucemia linfática.

Otros Medicamentos y Ampicilina Cápsulas

- Su medicamento puede interferir con otros medicamentos que esté tomando. Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente, cualquier otro medicamento incluso aquellos sin receta, especialmente cualquiera de los siguientes:
- Alopurinol, sulfpirazona o probenecid (usados para tratar la gota)
 - Tetraciclina, eritromicina y cloranfenicol (otros tipos de antibióticos)
 - Anticoagulantes, por ejemplo, warfarina o fenindiona.
 - Fármacos citotóxicos, por ejemplo, metotrexato (usado para tratar la artritis reumatoide, psoriasis, o enfermedades malignas tales como leucemia linfática.)
 - Cloroquina (usada para la prevención y el tratamiento de la malaria)
 - Vacuna antitifoidea oral (usada para prevenir la fiebre tifoidea)

Mientras esté tomando ampicilina, los resultados de determinadas pruebas médicas podrían verse afectados. Si está realizándose análisis de sangre u orina, informe a su médico de que está tomando ampicilina.

Embarazo y lactancia

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene previsto quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

3. ¿COMO TOMAR AMPICILINA 500mg CÁPSULA?

“Siga exactamente todas las instrucciones de su médico o farmacéutico para la administración oral del medicamento”

AMPICILINA 500mg CÁPSULA

Tome siempre este medicamento exactamente como se describe en este prospecto o como le haya dicho su médico o farmacéutico. Compruebe con su médico o farmacéutico si no está seguro. Las cápsulas deben tomarse por vía oral con el estómago vacío, al menos de treinta minutos a una hora antes de las comidas/alimentos. Es importante que tome su medicamento en los momentos adecuados.

La dosis dependerá del paciente y la decidirá su médico. Sin embargo, las dosis habituales para cada enfermedad son:

Adultos (incluyendo los ancianos)

- Oído, Nariz y garganta 250mg cuatro veces al día
- Bronquitis 250mg cuatro veces al día
- Neumonía 500mg cuatro veces al día
- Infecciones de las vías urinarias 500mg tres veces al día
- Infecciones 500-750mg de tres a cuatro veces al día
- Gastrointestinales Agudas: 1-2 gramos cuatro veces al día durante dos semanas
- Fiebre tifoidea Portadores: 1-2 gramos cuatro veces al día durante cuatro a 12 semanas
- Gonorrea 2 gramos por vía oral con 1 gramo de probenecid como dosis única. Puede ser necesaria una dosis repetida en mujeres.

La dosificación puede reducirse en pacientes con insuficiencia renal aguda.

Niños menores de 10 años

Habitualmente los niños toman la mitad de la dosis de los adultos.

Si toma más medicamento del que debería

Si usted (u otra persona) toma accidentalmente demasiado medicamento, consulte con su médico o farmacéutico inmediatamente.

Si olvida tomar su medicamento

Si olvida tomar una dosis, tómela lo antes posible en cuanto se acuerde, después continúe como antes. No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

Si deja de tomar su medicamento

Siga tomando su medicamento hasta que su médico le diga que pare. No deje de tomarlo solamente porque se sienta mejor. Si deja de tomar el medicamento, su infección puede volver o empeorarse. Si aún sigue enfermo tras tomar el medicamento, visite a su médico.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Como todos los medicamentos, la Ampicilina puede provocar efectos adversos, aunque no todo el mundo los padece. Si se producen, probablemente serán temporales y no graves. Sin embargo, algunos pueden ser graves y requerir atención médica.

Si experimenta cualquiera de los siguientes acontecimientos, DEJE de tomar su medicamento y dígaselo a su médico o vaya al hospital más cercano inmediatamente:

- Hipersensibilidad o reacción alérgica grave llamada anafilaxia, que provoca dificultad para respirar.
- Hinchazón de los labios, mejillas, lengua y párpados.
- Erupción cutánea, picor o cualquier otro problema de la piel, tal como ampollas y manchas o ronchas rojas e inflamadas. Estas reacciones pueden producirse si tiene mononucleosis infecciosa, infección por citomegalovirus (CMV) o leucemia linfática y también si está tomando ampicilina.
- Amarillamiento de la esclerótica (parte blanca del ojo) y la piel.
- Dificultad o malestar para orinar, tener sangre en la orina o dolor en la zona lumbar (pueden ser signo de inflamación del riñón)
- Colitis pseudomembranosa (diarrea aguda que puede contener sangre o mocos).

Los siguientes acontecimientos son menos graves pero puede desear consultarlos con su médico o farmacéutico si se vuelven problemáticos o duran mucho tiempo

Efectos adversos frecuentes (es decir, se han comunicado en más de 1 de cada 100 personas) incluyen:

- Diarrea
- Náuseas y vómitos (sentirse y estar enfermo).

Efectos adversos muy raros (es decir, se han comunicado en menos de 1 de cada 10.000 personas) incluyen:

- Trastornos de la sangre temporales que pueden provocar que tenga más infecciones tales como fiebre, escalofríos intensos, dolor de garganta, úlceras bucales o hacerse hematomas más fácilmente. También pueden provocar anemia, esto puede hacer que su piel se vuelva pálida, provocar debilidad, falta de aliento y cansancio.

RETIRO

COMUNICAR A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO CUALQUIER REACCIÓN ADVERSA QUE NO SE DESCRIBA EN EL INSERTO.

5. CONSERVACIÓN DE AMPICILINA 500mg CÁPSULA

No administrar luego de la fecha de expira indicada en el envase. Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. No administrar si observa el empaque dañado o deteriorado. Conservar en su empaque original. Consérvese a temperatura no mayor a 30°C, protegido de la luz y humedad.

6. INFORMACIÓN ADICIONAL

Composición: Cada cápsula contiene: Ampicilina 500mg.
Excipientes: Estearato de Magnesio.

7. FABRICADO POR:

Syntofarma S.A. - Colombia

8. REFERENCIA:

MHRA
2016
Athlone Laboratories Limited

9. REVISION LOCAL:

Versión 1
Diciembre/2016

Genfar®
UNA EMPRESA SANOFI

EMPAQUE

Referencia: Inserto Ampicilina
500 mg - Cápsulas

Código SAP: POR ASIGNAR

Código de Arte: I281

Versión: 2

Dimensiones: Abierto: 110 x 160 mm
Cerrado: 55 x 40 mm
Forma de entrega: Plegado

Pharmacode: POR ASIGNAR

Tintas: 1
Pantone Negro U

País: PERÚ

Fecha: 12 Junio 2019

Histórico:
Nuevo Cód. SAP y Pharmacode
Version 2 N.I. sustituye 1.1 I.A. SAP 4010355
de 31 de Oct de 2014

Nota: Verifique cuidadosamente el contenido de esta muestra antes de enviarla a impresión.

DISEÑO CON FINES REGULATORIOS

VR I281-2