

Gentar®

INSERTO PARA EL PACIENTE

- Conserve este inserto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarles.
- Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

1. ¿Qué es Espironolactona 25mg Comprimidos y para qué se utiliza
2. ¿Qué necesita saber antes de empezar a tomar Espironolactona 25mg Comprimidos
3. ¿Cómo tomar Espironolactona 25mg Comprimidos
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación
6. Información adicional

Espironolactona es un medicamento que pertenece al grupo de fármacos llamados diuréticos. Son los medicamentos que aumentan la eliminación de líquidos del organismo.

Esprionolactona se utiliza para reducir la tensión arterial elevada (hipertensión), la hinchazón por acumulación de líquidos (edemas) que causan ciertas enfermedades del riñón, hígado o del corazón y en el tratamiento de la insuficiencia cardiaca en combinación con otros medicamentos utilizados. También se utiliza en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades causadas por una producción anormalmente elevada de una hormona natural (aldosterona). Los niños deben ser tratados únicamente bajo supervisión de un pediatra.

- Si es alérgico a espirolonactona o algún otro medicamento similar o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).
- Si padece ciertas alteraciones de la función renal (insuficiencia renal aguda, función renal muy alterada, falta de llegada de orina a la vejiga o anuria).
- Si presenta elevados niveles de potasio en sangre.
- Si sufre una enfermedad llamada enfermedad de Addison, que produce un daño de la corteza suprarrenal dando lugar a una deficiencia hormonal.
- Si está en tratamiento con eplerenona (medicamento utilizado para ayudar a prevenir el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca tras un infarto de miocardio).

Los niños con insuficiencia renal grave no deben tomar espironolactona.

- Consume a su médico, farmacéutico o enfermero antes de empezar a tomar espironolactona 25mg comprimidos.
- Si tiene problemas hepáticos graves, incluyendo cirrosis hepática.
- Si es diabético.
- Si padece de problemas renales, especialmente niños con hipertensión, hepáticos, una insuficiencia cardíaca grave o si se usará ancina, el empleo de espironolactona puede alterar sus niveles de algunos electrolitos por lo que su médico realizará un control periódico.
- Si está en tratamiento con otros medicamentos que se utilizan para el tratamiento de la tensión alta o para la insuficiencia cardíaca (diuréticos que retienen potasio, inhibidores de la enzima convertidora angiotensina (ECA), antagonistas de la angiotensina II, bloqueantes de la aldosterona) o con medicamentos para impedir la coagulación de la sangre (heparinas), ya que el

Si está en tratamiento con medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (para el dolor y la inflamación) o con betabloqueantes (para el tratamiento de la tensión arterial y otros problemas de corazón), ya que sus niveles de espironolactona con estos medicamentos puede dar lugar a un aumento de sus niveles de potasio en la sangre.

Se debe evitar la utilización de suplementos dietéticos de régimen (sustitutos de la sal que contienen potasio), con dietas ricas en potasio o con suplementos de potasio ya que se puede producir una intoxicación grave al aumentar sus niveles de potasio en la sangre.

Si padece una insuficiencia cardíaca leve o moderada, ya que este medicamento puede aumentar sus niveles de potasio en la sangre.

Si tiene más de 80 años, su médico valorará como funcionan sus riñones.

La administración concomitante de espironolactona con ciertos medicamentos, suplementos de potasio y alimentos ricos en potasio puede provocar hipertenсия grave (aumento del nivel de potasio en sangre). Los síntomas de una hipertenсия grave podrían incluir calambres musculares, ritmo cardíaco irregular, diarrea, náuseas, mareo o dolor de cabeza.

Medicamentos que pueden alterar los niveles de potasio en sangre (por ejemplo, diuréticos ahorradores de potasio, inhibidores de la ECA, antagonistas de la angiotensina II y los suplementos de potasio).

La administración conjunta de espirolonactona con medicamentos que se sabe que aumentan los niveles de potasio en sangre puede dar lugar a una situación grave de aumento de los niveles de potasio en sangre.

Carboxenolona (para el tratamiento de las úlceras de estómago o del intestino).

Medicamentos antiinflamatorios no esteroideos para el dolor y la fiebre (por ejemplo, aspirina, fenazona, indometacina, ácido mefenámico).

Medicamentos que pueden alterar el equilibrio de los electrolitos en el organismo (por ejemplo, cloruro de amonio, colestiramina).

Ciertos medicamentos antiinflamatorios (corticosteroides).

Otros medicamentos que bajan la tensión arterial (antihipertensivos).

Alcohol, barbitúricos, narcóticos.

Norepinefrina (noradrenalina), medicamento utilizado en situaciones de emergencia para elevar la tensión arterial.

Digoxina (medicamento para regular el ritmo cardíaco).

Medicamentos que disminuyen la capacidad de coagulación de la sangre (dicumarínicos).

Lito

Trimetoprima y trimetoprima/sulfametoxazol

No tome espironolactona si está dando de lactar a su hijo.

En algunas ocasiones los pacientes han presentado alteraciones de los electrolitos de la sangre, y muy raramente esto ha desembocado en una situación grave potencialmente mortal (llamada hiperpotasemia). Si tiene alteraciones del ritmo cardíaco, sensación de hormigueo, debilidad muscular, parálisis flácida o espasmos musculares, deje de tomar espironolactona y avise a su médico inmediatamente.

CLES56173E 1366-1.2

02

Lineas no imprimibles

SANOFI 

EMPAQUE

Referencia:
Inserto Espironolactona 25 mg

Código SAP: POR ASIGNAR

Código de Arte: 1366

Versión: 1 **Revisión: 2**

Código de Monografía:

N/A

Dimensiones: 140 x 150 mm

Pharmacode: POR ASIGNAR

Tintas: 1

 Pantone Negro

Color No imprime : Líneas plano y acotado

País: PERÚ

Fecha: 10 Abril 2019

Histórico:

Nuevo SAP y Pharmacode

Nota: Verifique cuidadosamente el contenido de esta muestra antes de enviarla a impresión.