

INSERTO PARA EL PACIENTE**MOMETASONA FUROATO 0.1%****Crema****Corticosteroide tópico****Lea todo el inserto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento.**

- Conserve este inserto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarles.
- Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

CONTENIDO DEL INSERTO

1. Qué es Mometasona Furoato 0.1% Crema y para qué se utiliza?
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Mometasona Furoato 0.1% Crema
3. Como usar Mometasona Furoato 0.1% Crema
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación
6. Información adicional

1. ¿Qué es Mometasona Furoato 0.1% Crema y para qué se utiliza?

Mometasona Furoato 0.1% crema forma parte de un grupo de medicamentos llamados corticosteroides tópicos. Se clasifica como un "potente corticosteroide". Estos medicamentos se ponen en la superficie de la piel para reducir el enrojecimiento y la picazón causado por determinados problemas de la piel. En adultos y niños, Mometasona Furoato 0.1% crema se utiliza para reducir el enrojecimiento y la picazón causada por ciertos problemas de la piel llamada psoriasis o dermatitis. La psoriasis es una enfermedad de la piel en la que picazón, escamas y placas rosadas se desarrollan en los codos, rodillas, cuero cabelludo y otras partes del cuerpo. La dermatitis es una condición causada por la piel que reacciona a los agentes externos por ejemplo detergentes, haciendo que la piel se ponga roja y con picazón.

2. ¿Qué necesita saber antes de empezar a tomar Mometasona Furoato 0.1% Crema

No utilice Mometasona Furoato 0.1% Crema:

- ✓ Si es alérgico (hipersensible) a Mometasona Furoato, o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento u otros medicamentos similares.
- ✓ En cualquier otro problema de la piel, ya que podría empeorar de manera especial.
- ✓ rosácea (una enfermedad de la piel que afecta a la cara)
- ✓ acné
- ✓ atrofia de la piel (adelgazamiento de la piel)
- ✓ dermatitis alrededor de la boca
- ✓ picazón en los genitales
- ✓ dermatitis del pañal

- ✓ herpes labial
- ✓ varicela
- ✓ culebrilla
- ✓ verrugas
- ✓ piel ulcerada
- ✓ heridas
- ✓ otras infecciones de la piel

Advertencias especiales y precauciones de empleo

Consulte a su médico o farmacéutico antes de aplicarse Mometasona Furoato 0.1% crema.

Si su piel se irrita o se sensibiliza después de utilizarlo, debe dejar de usarlo e informar a su médico.

Interacciones con otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento incluso los adquiridos sin receta.

Embarazo y Lactancia

Debe informar a su médico si está embarazada o en periodo de lactancia, antes de empezar a usar Mometasona Furoato 0.1% Crema.

3. Como usar Mometasona Furoato 0.1% Crema

Mometasona Furoato 0.1% Crema, Vía Tópica

Dosificación

Por lo general, para adultos y niños de 2 años o más, una fina capa de crema de Mometasona Furoato 0.1% debe ser frotado suavemente en el área afectada de la piel una vez al día.

Uso en Niños:

Mometasona Furoato 0.1% crema no se recomienda para niños menores de 2 años.

Antes de utilizar Mometasona Furoato 0.1% Crema

Siempre debe seguir estas instrucciones al utilizar Mometasona Furoato 0.1% Crema:

- No utilice la crema en la cara durante más de 5 días.
- No aplique la crema a los niños, en cualquier parte de su cuerpo, por más de 5 días.
- No ponga la crema bajo el pañal a su hijo, ya que esto hace que sea más fácil para que el fármaco pase a través de la piel y posiblemente causar algunos efectos adversos.
- Debe consultar con su médico antes de cubrir las áreas tratadas con un vendaje o yeso. Las áreas tratadas en la cara o en los niños no deben cubrirse con un vendaje o yeso.
- No se debe utilizar una gran cantidad de crema en grandes áreas del cuerpo por un largo tiempo (por ejemplo, todos los días durante muchas semanas o meses).
- No utilice en o alrededor de los ojos, incluyendo los párpados.

Si usa más Mometasona Furoato 0.1% Crema del que debiera:

- Si usted (o alguien más) ingiere accidentalmente la crema, no debe producirse ningún problema. Sin embargo, si usted está preocupado, debe consultar a su médico.
- Si utiliza la crema más a menudo de lo que debería, o en grandes áreas del cuerpo, esto puede afectar algunas de sus hormonas.
- En los niños, esto puede afectar su crecimiento y desarrollo.
- Si no ha utilizado la crema como se le indicó y lo ha usado con demasiada frecuencia y/o durante mucho tiempo, usted debe informar a su médico.

Si olvidó usar Mometasona Furoato 0.1% Crema:

- Si olvidó usar su crema en el momento adecuado, úsela tan pronto como se acuerde y luego siga como antes.

Si deja de usar Mometasona Furoato 0.1% Crema:

- Si usted ha estado utilizando Mometasona Furoato 0.1% Crema durante mucho tiempo y su problema de piel parece haber mejorado, no debe de dejar de usar repentinamente la crema. Si lo hace, es posible que su piel se enrojezca y pueda notar escozor o ardor. Para evitar esto, usted debe hablar con su médico ya que se reducirá de forma gradual la frecuencia con que se debe utilizar la crema hasta que se detenga el tratamiento por completo.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, Mometasona Furoato 0.1% crema puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Algunas personas pueden notar que sufren de algunos de los siguientes efectos secundarios después de usar Mometasona Furoato 0.1% crema:

- Reacciones alérgicas de la piel
- Infecciones bacterianas y secundarias de la piel
- Acné
- Inflamación y/o infección de los folículos pilosos
- Adelgazamiento de la piel
- Marcas de color rojo asociado con sarpullido
- Pérdida de color de la piel
- Quemazón
- Escozor
- Picazón
- Hormigueo
- Crecimiento excesivo de vello
- Ablandamiento de la piel y las estrías

Otros efectos secundarios que pueden ocurrir con corticosteroides tópicos son piel seca, irritación de la piel, dermatitis, dermatitis alrededor la boca, y pequeños vasos sanguíneos dilatados

COMUNICAR A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO CUALQUIER REACCION ADVERSA QUE NO SE DESCRIBA EN EL INSERTO

5. Conservación de Mometasona Furoato 0.1% Crema:

No administrar luego de la fecha de expira indicada en el envase.

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

No administrar si observa el empaque dañado o deteriorado.

Conservar en su empaque original.

Consérvese a temperatura no mayor a 30°C, protegido de la luz y la humedad.

6. INFORMACION ADICIONAL

Composición de Mometasona Furoato 0.1% Crema:

Cada 100g de crema contiene 0.1g de Mometasona Furoato

Excipientes: Aceite Mineral Liviano, Alcohol Cetoestearílico, Cetomacrogol 1000, Edetato Disódico, Metilparabeno, Propilenglicol, Propilparabeno, Vaselina Blanca, Agua purificada.

7. FABRICANTE

Fareva Villa Rica S.A.S. -Colombia

8. REFERENCIA:

MHRA

08/2015

Merck Sharp & Dohme Limited

9. REVISION LOCAL:

Versión 1

Octubre/2016